

25^e jaargang
Nummer 6
December 2015

AGAPORNIS

25th volume
Number 6
December 2015

AGAPORNIS ROSEICOLLIS DOMINANT BONT GROEN
AGAPORNIS ROSEICOLLIS: (DOMINANT) PIED



ZIEKTEN & IMMUNITEIT BIJ AGAPORNIDEN
LOVEBIRD DISEASES & IMMUNITY



AGAPORNIS FISCHERI VIOLET



ZO DOE IK HET I HOW WE DO IT
JACEK EN MARTA NITSCH



BELGISCHE VERENIGING AGAPORNIDEN



ZO DOE IK HET | HOW WE DO IT JACEK EN MARTA NITSCH

Ik ben vereerd om mijn passie voor het kweken van agaporniden te delen met een breder publiek. Ik woon in een klein dorp in het zuiden van Polen. Mijn avontuur met agaporniden begon in de late 1990. Het begin was extreem moeilijk omdat ik weinig toegang had tot goede kwaliteitvogels en gespecialiseerde literatuur. Het jaar 2005 was een doorbraak. Het was toen dat ik er in slaagde om boeken te vinden over het kweken van vogels. Het internet was ook zeer nuttig. Al dit hielp mij om mijn eigen richting te bepalen en toonde dat de kwaliteit van vogels veel belangrijker is dan hun aantal. Het hielp mij om de soorten te kiezen die ik nu kweek.

Ik begon te kweken met 9 koppels *A. personatus* groen en 6 koppels *A. fischeri*, deze kwamen van 5 landen in Europa. Gradueel introduceerde ik nieuwe vogels van gekende kwekers. Ik denk dat dit de minst risicovolle manier is omdat we dan zeker zijn van de origine van de vogels, we kennen de condities waarin ze leefde, welk voedsel ze kregen en wat we van hun kunnen verwachten.

Mijn nieuwe aangekochte vogels worden in aparte kooien

I am deeply honoured to present my passion of breeding lovebirds to a wider audience. I live in a small town in the south of Poland. My adventure with lovebirds started in the late 1990's. The beginning was extremely hard, as I had little access to good quality birds and specialist literature. The year 2005 was a breakthrough, it was then I managed to get hold of books about breeding birds. The internet turned out to be very helpful, too. All this helped me determine my own direction, showed that the quality of birds is more important than their number and helped me choose the species I now breed.

I started my breeding with 9 green *A. personatus* and 6 green *A. fischeri* from five parts of Europe. I gradually introduced new specimens which I got only from renowned breeders. I think this is the least risky way - we can be certain of the origin of the birds, we know in what conditions they were kept, how they were fed and what we can expect of them.

The newly purchased birds are kept in separate cages for four weeks in order for them to become acclimatised. For this pur-



gehouden gedurende vier weken zodat ze kunnen acclimatiseren. Hiervoor gebruik ik training kooien in een kamer naast de vogelkamer. Ik denk dat een dergelijke werkwijze essentieel is voor het introduceren van nieuwe vogels. Het zorgt er voor dat ze kunnen wennen aan de nieuwe levens- en voedingsomstandigheden. We kunnen dan bekijken of het nieuwe voedsel goed gegeten wordt, de acclimatisatie goed gaat en de conditie niet verslechtert. Elke nieuwe plaats is niet enkel een bron van stress maar ook een achtergrond met verschillende bacteriën en virussen die verschillende gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken voor de nieuwe vogels. Daarom moeten we ze de tijd geven om zich aan te passen.

Op het moment werk ik met ongeveer 120-130 vogels:

- Agapornis personatus: groen, blauw, D blauw, violet. Ik begin ook te werken met Dominant edged.
- Agapornis fischeri: groen, blauw, violet, albino, lutino, dec groen en blauw. Ik begin ook te werken met Dominant edged en euwing.



pose, I use training cages in a room adjoining the bird room. I think such practice is essential with introducing new birds, as it allows them to get used to new living and feeding conditions. We can then assess if the new food is completely eaten and if the acclimatisation is going well and the bird's physical shape isn't deteriorating. Each new place is not only a source of stress, but also a background with different bacteria and viruses which can cause a lot of health problems for the new birds. Hence, we must give them time to adjust and produce appropriate antibodies.

At the moment I work with about 120-130 specimens:

- Agapornis personatus: green, blue, D blue and violet. I'm starting to work with Dominant edged.
- Agapornis fischeri: green, blue, violet, albino, lutino, DEC green and DEC blue. I'm starting to work with Dominant edged and euwing.

Wildcolour birds are my favourite.

I pay particular attention to living conditions, hygiene and proper feeding. Just like any other breeder, I've experimented with things that worked perfectly well for other breeders, yet in my case they didn't seem to work at all. For 2 years I tested various seed mixtures and very often 40% of the food was left untouched and the birds were hungry. Other times, the birds were overweight. I've noticed that not only the length but also the height of an aviary is beneficial for the bird's fitness and weight. Therefore, I place all food trays at the bottom of aviaries, which makes the birds more active and forces them to make a greater effort. Containers with water are placed higher.

For 6 years I've been feeding my birds with a seed mixture comprising of 48% of #71 Agapornis Premium, 48% of #68 Parakeet without sunflower seed and 4% of #93 -Healthseed mixture supreme, all from Deli Nature. 95% of it is eaten (one teaspoon of seed per bird daily). I enrich the basic birdseed with sprouted wheat and Curol oil from Comed. Before offering the seed, I rinse it under running water and then dry it with paper towels. Readymade seed mixtures were eaten reluctantly and in small amounts.

Additionally, once a week I offer egg food from CEDE. In the summer and autumn I feed corn and unripe cereal spikes; grass spikes, herbs, carrots, apples, elder fruit (rowan fruit and pine twigs with needles kill parasites of the digestive tract). Moreover, I give the birds twigs of birch, willow and fruit trees (all of them come from my out-of-town garden), as there are a lot of vitamins under the bark. Corncobs, elder and rowan can be kept in larger amounts in the fridge.

Every day the birds get fresh drinking water. I add apple cider vinegar PH 5.5 twice a week. The birds seem to like it. I make the vinegar myself, as only then it has a mild smell and taste. During the moult I give the birds water with biotin once a week. Throughout the year I give them sepiä, mineral mixture and grit.

The birds are in the garden aviary till the end of September - mid October, when the temperature at night falls to about 6°C. Then I move the birds to the indoor bird room on the ground floor of my house, where I breed the birds. There, the temperature reaches 17-19°C and daylight lasts from 7am-10pm.

Wildkleur zijn mijn favorieten.

Ik besteed in het bijzonder aandacht aan de leefomstandigheden, hygiëne en juiste voeding. Zoals elke andere kweker heb ik geëxperimenteerd met dingen die perfect werkten voor andere kwekers maar in mijn geval leken ze niet te werken. Gedurende 2 jaar testte ik verschillende zaadmengelingen en vaak was 40% van het voedsel onaangeraakt en waren de vogels hongerig. Andere keren hadden de vogels overgewicht. Ik heb gemerkt dat niet enkel de lengte maar ook de hoogte van een voliere voordelig is voor de conditie en het gewicht van vogels. Daarom plaats ik de eetbakken onderaan in de voliere wat de vogels actiever maakt en dwingt hen om een grotere inspanning te leveren. Het water wordt hoger geplaatst.

Gedurende 6 jaar voed ik mijn vogels met een zaadmengeling van 48%--71- Agapornis premium 48%--68- parkiet zonder zonnebloem pitten 4% --93 -onkruidzaden van Deli Nature. 95% ervan wordt opgegeten (1 theelepel zaad per dag per vogel). Ik rijk het basiszaad aan met gekiemd zaden en Curol olie. Voordat ik het zaad geef spoel ik het af onder stromend water en droog ik het met keukenpapier. Voorgemaakte zaadmengsels worden met tegenzin gegeten en in kleine hoeveelheden.

Additioneel, geef ik 1 maal per week een eivoer van CEDE. In de zomer en herfst geef ik mais en onrijpe graanhalmen, grashalmen, kruiden, wortelen, appels, vlierbessen, lijsterbes en pijnboomtakjes met naalden (deze doden de parasieten in de spijsverteringsstelsel). Verder geef ik de vogels verse twijgjes van berk, wilg en fruitbomen(al deze komen uit mijn tuin) omdat er veel vitamine onder de schors zitten. Maïskolven, vlierbes en lijsterbes kan je in grote hoeveelheden in de ijskast bewaren.

Elke dag krijgen de vogels vers drinkwater. Ik voeg er tweemaal per week appelazijn tot een PH van 5,5 toe. De vogels lijken het lekker te vinden. Ik maak de azijn zelf omdat het enkel dan een milde reuk en smaak krijgt. Tijdens de rui geef ik de vogels water met biotine 1x per week. Doorheen het jaar geef ik sepia, een mineraal mengeling en grit.

De vogels zitten in de tuinvoliere tot eind september-midden oktober, tot wanneer de nachttemperatuur rond 6°C is. Dan verplaats ik de vogels binnenshuis op de benedenverdieping van mijn huis, waar ik de vogels verpaar. Daar is de temperatuur 17-19°C en is er daglicht van 7u tot 22u.

Ik kies enkel de sterkste vogels om mee te kweken: gewicht min. 55gr. verenkleed zonder fouten en een overeenstemmend patroon, goede houding, zeer goede conditie en minstens 18 maanden oud. Met al deze criteria word er rekening gehouden tijdens de selectie.

Daarna worden de gepaarde koppels in de kweekkooien geplaatst, waar ik ze hun gewoonlijke zaadmengeling geef tot 4 weken voor ze de nestkasten krijgen. Elke andere dag krijgen ze gekiemde zaden en een kleine hoeveelheid fruit en groenten. Daarnaast krijgen ze droog eivoer, sepia, grit en een jodium-blokje. De vogels krijgen wilgentakken voor hun nest.

Bij het uitkomen van de jongen geef ik de vogels fruit en groenten (appels, wortels, selder, peterselie, geraspte biet en ijsberg-



I choose only the strongest birds for reproduction: weight min. 55 grams, plumage without any faults and congruent with pattern, good posture, very good physical shape, age at least 18 months. All the above criteria are taken into account during selection.

Then, the paired couples are placed in nesting cages, where for four weeks before installing nesting boxes I feed them with their usual seed mixture. Every other day they get sprouted wheat and a small amount of fruit and vegetables. Apart from that, they get a dry egg food, sepia, mineral cube and grit. The birds get willow twigs for their nests.

After hatching I feed the birds with fruit and vegetables (apples, carrots, celery, parsley, grated beetroot and iceberg lettuce with a small amount of egg food and vitamins WINMIX Bird every other day. The young which are thus fed by their parents eat such food very eagerly when they grow up.

Very often my newly purchased birds needed a few months to get used to the new food and eat only a chosen type of grain. They refused to eat the new food when they were kept in separate cages, but after joining the other birds they started to eat everything.

I have four outdoor aviaries with a roof. They are steel with





Gouden Ring Show Show Bague d'Or

5 & 6 december 2015

9 - 18 uur

Expo-Schiervelde - Roeselare

www.goudenring.be

verantw. uitgever: vzw Gouden Ring Show

INFO

Dirk Dumon, Zwevezelestraat 30, B-8810 Lichtervelde
tel. 0032 51 72 28 49 - fax 0032 51 72 71 92 - dumon.dirk@telenet.be



sla) met een kleine hoeveelheid eivoer en vitamine WINMIX bird elke andere dag. De jongen die gevoerd worden door hun ouders eten dit voedsel ook graag wanneer ze zelfstandig zijn.

Vaak hebben nieuw aangekochte vogels een paar maanden nodig om gewoon te worden aan hun nieuwe voedsel en eten ze enkel 1 bepaald type van graan. Ze weigeren het nieuwe voedsel te eten wanneer ze in aparte kooien zitten maar nadat ze bij de andere vogels zitten eten ze alles.

Ik heb 4 buitenvolieres onder een afdak. Ze zijn van staal met een betonnen basis. Elke voliere is 3mx1,5mx2,5m. De vogels zitten daar van eind mei tot midden Oktober. Mijn vogelkamer binnenshuis is 30 m2 en bevat 5 aluminium volieres (155cmx95cmx220cm), twee kooien voor jonge vogels (150cmx90cmx90cm), 22 kweekkooien (100cmx50cmx50cm), en 12 trainingskooien (50cmx30cmx 35cm). Er is Led en UV dag- en nachtlucht welke automatisch werkt. Om de kwaliteit van de lucht te verbeteren gebruik ik een ionisator en een grote water filter. Het helpt om een constante vochtigheid van 60% en een temperatuur van 18°C te behouden. Het reduceert ook de hoeveelheid stof in de lucht.

Voor het voeren gebruik ik roestvrijstalen voederbakken. Ik heb 3 sets die elke dag veranderd worden. De volieres, kooien, voedsel en drinkbakken worden gedisinfecteerd met F10 i F10-SC. Verder gebruik ik middelen met chlorine in om de zitstokken van de kooien te reinigen.

Mijn doel is om systematisch de kwaliteit van mijn vogels te verbeteren, dit zal er voor zorgen dat ik in de toekomst mijn vogels kan tonen samen met de beste van de wereld. Door zoveel jaren met vogels doorgebracht te hebben weet ik dat ze me veel meer geven dan wat ik te bieden heb. Ze helpen me de alledaagse problemen te vergeten en me te ontspannen. Ze geven me de gelegenheid om vele grote kwekers en vriendelijke mensen te ontmoeten die bereid zijn hun kennis met mij te delen ondanks de taalbarrières.

Ik dank alles wat ik bereikt heb in het kweken van agaporniden aan mijn vrouw Marta, zij is de ideale levenspartner en een grote steun in mijn passie. Zij beschikt over een ruime kennis en gevoel en kan goed reageren in moeilijke situaties. Als ik weg ben is zij iemand die ik met mijn vogels kan vertrouwen. Ik wens iedereen iemand zoals zij.

De informatie die ik opgenomen heb in dit artikel is niet compleet maar 100% getest en aangepast aan mijn omstandigheden. Het zorgt voor goede resultaten en werkt goed. Ik denk echter dat we heel de tijd leren dat we goed moeten luisteren naar de stem van de natuur en wat het ons vertelt.

Vriendelijke groeten,
Jacek en Marta Nitsch - www.personata.pl

a concrete base, measuring 3mx1.5mx2.5m. The birds live there from the end of May till mid October. My indoor bird room is 30m2 and contains 5 aluminium aviaries (155cmx95cmx220cm tall), two cages for young birds (150cmx90cmx90cm tall), 22 breeding cages (100cmx50cmx50cm), and 12 training cages (50cmx30cmx 35cm tall). There's LED and UV day-and-night light source, which operates automatically. In order to improve the quality of air I use an ionisation air purifier and a humidifier. It helps maintain a constant humidity level of 60% at the temperature of 18oC. It also considerably reduces the amount of dust in the air.

For feeding I use stainless steel trays. I have three sets which are changed every day. The aviaries, cages, food and water containers are disinfected with F10 i F10-SC agent. Additionally, I use agents with chlorine for cleaning trays from the cages.

My aim is to systematically improve the quality of my birds, which will allow me to present them among the best birds in the world in future. Having spent so many years with birds I'm sure they give me much more than I have to offer. They allow me to forget about everyday problems and help me chill out. They also give me the opportunity to meet many great breeders and kind people who are willing to share their knowledge with me regardless of language barriers.

I owe everything I have achieved in breeding lovebirds to my wife Marta, who is a perfect partner and greatly supports my passion. She has ample knowledge and initiative, and can react properly in difficult situations. When I'm away she is someone I can entrust my birds with. I wish everyone has someone like her close by.

The information I've included in this article is incomplete but 100% tested and adjusted to my conditions. It ensures good results and works well. I think, though, that we learn all the time and we should listen to the voice of nature and do what it tells us.

Kind regards to all,
Jacek and Marta Nitsch - www.personata.pl

